

AGRO-ETHOFUMESAT®

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouvlákných plevelů v cukrové řepě, krmné řepě a červené řepě salátové.

Evidenční číslo přípravku: 4723-1

Držitel rozhodnutí o povolení a výrobce přípravku:

UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Velká Británie

Distributor pro Českou republiku:

AGROFERT, a.s., Pylšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

Účinná látka: 500 g/l (50%) ethofumesát (ISO), tj. (2RS)-2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-methansulfonát.

- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 P391 Unikátní produkt seberte.
 P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

EI(H)401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Označení přípravku z hlediska rizik pro neцелеvé organismy a životní prostředí:

(SP1) Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikáčními zařízeními v blízkosti povrchové vody. /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

(OP 1) st.1 Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

(SPe1) Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiné, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát, vícetkrát než jednou za tři roky.

(SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úroveň dodržení nešetěného ochranného pásma 2m vzhledem k povrchové vodě.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, vel, nevlodných členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a nevlodných rostlin.

Před použitím si přečtěte příložený pokyn.

Nebezpečné látky (S 20 zákona 356/2003) obsaženy v přípravku: ethofumesát (CAS:26225-79-6; 1,2-ethandiol CAS:107-21-1).

Balení a objem (čistá hmotnost): HDPE kanistr 4 x 5 l (5,65 kg)

Číslo šarže/Datum výroby: viz obal

Datum ukončení doby použitelnosti: viz obal

Použitelné do: Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Za podmínek:

- Neporušené originální obaly, těsně uzavřené, chráněné před světlem a vlhkostí
- Skladovat odděleně od potravin, nápojů, chránit před mrazem a přímým slunečním svitem
- Chránit před zdrojů zapálení
- Skladovací teplota +5 až +35°C

První pomoc:

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/přívalemého letáku.

První pomoc při nadržání aerosolu při aplikaci: Převléčte oblečení, zajištěte tělesný a dýchací klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Pletřvají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajištěte odborné lékařské ošetření).

První pomoc při náhodném požití: Ista vypláchněte vodou (pokud je předpoklad, že požití není vřívá a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s **Toxicologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Působení přípravku:

Přípravek AGRO-ETHOFUMESAT je benzenofuranový herbicid k hubení jednoletých dvouvlákných plevelů. AGRO-ETHOFUMESAT může být používán před vzejitím nebo po vzejití plodiny v kulturách cukrové řepy, krmné řepy a červené řepy salátové.

Spektrum účinnosti:

Plevelé citlivé: bažanka roční, běry, drchlička rolní, chundelka metlice, konopice rolní, kolenc rolní, lesknice, lipnice rolní, psárka rolní, ptáčinek žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítlula, pěřoura, pomněnka rolní.

Plevelé méně citlivé: chřpa modrák, jeřábka kuřní houa, laskavce, metličky, mák vlčí, rozrazil, výjdro obilnin, zeměděm lékařský, kopřetina polní, kopřivka žahavka, iliek černý, oves hluchý, psárka polní, violka rolní.

Návod k použití – indikace

| Plodina, oblast použití | Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, místelnost | OL | LA | Poznámka |
|---|--|-------------------------------|----|----|--|
| cukrovka, řepa krmná, řepa salátová červená | plevelé dvouvlákné jednoleté | 2 l/ha 200-400 l vody/ha | AT | - | preemergentně max. 1x |
| cukrovka, řepa krmná, řepa salátová červená | plevelé dvouvlákné jednoleté | 1,2 l/ha 200-400 l vody/ha | AT | - | ve f. 218BA od: 10B8CH, do: 11B8CH délřná aplikace 2x0,6 l/ha |

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizni.



4x5L